

M é m o i r e

sur

les équations algébriques

où on démontre l'impossibilité de la résolution de l'équation générale
du cinquième degré

par

N. H. Abel.

Christiania.
De l'imprimerie de *Groendahl.*
1824.

Démonstration

de l'impossibilité de la résolution générale des équations du
cinquième degré.

Les géomètres se sont beaucoup occupés de la résolution générale des équations algébriques, et plusieurs d'entre eux ont cherché à en prouver l'impossibilité; mais si je ne me trompe pas, on n'a pas y réussi jusqu'à présent. J'ose donc espérer que les géomètres veulent recevoir avec bienveillance ce mémoire qui a pour but de remplir cette lacune dans la théorie des équations algébriques.

Soit

$$y^5 - ay^4 + by^3 - cy^2 + d - e = 0$$

l'équation générale du cinquième degré et supposons qu'elle est résoluble algébriquement c'est-à-dire qu'on peut exprimer y par une fonction des quantités $a b c d$ et e , formée par des radicaux. Il est clair qu'on peut dans ce cas mettre y sous cette forme:

$$y = p + p_1 R^{\frac{1}{m}} + p_2 R^{\frac{2}{m}} + \dots + p_{m-1} R^{\frac{m-1}{m}}$$

m étant un nombre premier et $R p p_1 p_2$ etc. des fonctions de la même forme que y , et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on parviendra à des fonctions rationnelles des quantités $a b c d$ et e . On peut aussi supposer qu'il est impossible d'exprimer $R^{\frac{1}{m}}$ par une fonction rationnelle des quantités $a b$ etc. $p p_1 p_2$ etc., et en mettant $\frac{R}{p_1^m}$ au lieu de R il est clair qu'on peut faire $p_1 = 1$. On aura donc:

$$y = p + R^{\frac{1}{m}} + p_2 R^{\frac{2}{m}} + \dots p_{m-1} R^{\frac{m-1}{m}}$$

En substituant cette valeur de y dans l'équation proposée on obtiendra en réduisant un résultat de cette forme

$$P = q + q_1 R^{\frac{1}{m}} + q_2 R^{\frac{2}{m}} + \dots + q_{m-1} R^{\frac{m-1}{m}} = 0$$

q, q_1, q_2 etc. étant des fonctions rationnelles et entières des quantités a, b, c, d, e, p, p_1 etc. et R . Pour que cette équation puisse avoir lieu il faut que $q = 0, q_1 = 0, q_2 = 0$ etc. $q_{m-1} = 0$

En effet en désignant $R^{\frac{1}{m}}$ par z on aura les deux équations

$$z^m - R = 0 \text{ et } q + q_1 z + \dots + q_{m-1} z^{m-1} = 0$$

Si maintenant les quantités q, q_1 etc. ne sont pas égales à zéro ces équations ont nécessairement une ou plusieurs racines communes. Soit k le nombre de ces racines on sait qu'on peut trouver une équation du degré k qui a pour racines les k racines mentionnées et dans laquelle tous les coefficients sont des fonctions rationnelles de R, q, q_1 et q_{m-1}

Soit

$$r + r_1 z + r_2 z^2 + \dots + r_k z^k = 0$$

cette équation. Elle a ces racines communes avec l'équation $z^m - R = 0$; or toutes les racines de cette équation sont de la forme $\alpha_\mu \cdot z$, α_μ désignant une des racines de l'équation $\alpha_\mu^m - 1 = 0$. On aura donc en substituant les équations suivantes

$$r + r_1 z + r_2 z^2 + \dots + r_k z^k = 0$$

$$r + \alpha r_1 z + \alpha^2 r_2 z^2 + \dots + \alpha^k r_k z^k = 0$$

$$r + \alpha_{k-2} r_1 z + \alpha_{k-2}^2 r_2 z^2 + \dots + \alpha_{k-2}^k r_k z^k = 0$$

De ces k équations on peut toujours tirer la valeur de z exprimée par une fonction rationnelle des quantités r, r_1, r_2 etc. r_k , et comme ces quantités sont elles-mêmes des fonctions rationnelles de a, b, c, d, e, R, p, p_2 etc., il en suit que z est aussi une fonction rationnelle de ces dernières quantités; mais cela est contre l'hypothèse; Il faut donc que

$$q = 0 \quad q_1 = 0 \quad \text{etc.} \quad q_{m-1} = 0$$

Si maintenant ces équations ont lieu, il est clair que l'équation proposée est satisfaite par toutes les valeurs qu'on obtiendra pour y en donnant à $R^{\frac{1}{m}}$ toutes les valeurs

$$R^{\frac{1}{m}}, \alpha R^{\frac{1}{m}}, \alpha^2 R^{\frac{1}{m}}, \alpha^3 R^{\frac{1}{m}}, \text{etc.} \quad \alpha^{m-1} R^{\frac{m-1}{m}}$$

α étant une racine de l'équation

$$\alpha^{m-1} + \alpha^{m-2} + \dots + \alpha + 1 = 0$$

On voit aussi que toutes ces valeurs de y sont différentes; car dans le cas contraire on aurait une équation de la même forme que l'équation $P=0$, et une telle équation conduit comme on vient de voir à un résultat qui ne peut pas avoir lieu. Le nombre m ne peut donc surpasser 5. En désignant donc par y_1, y_2, y_3, y_4 et y_5 les racines de l'équation proposée on aura:

$$y_1 = p + R^{\frac{1}{m}} + p_2 R^{\frac{2}{m}} + \dots + p_{m-1} R^{\frac{m-1}{m}}$$

$$y_2 = p + \alpha R^{\frac{1}{m}} + \alpha^2 p_2 R^{\frac{2}{m}} + \dots + \alpha^{m-1} p_{m-1} R^{\frac{m-1}{m}}$$

$$y_m = p + \alpha^{m-1} R^{\frac{1}{m}} + \alpha^{m-2} p_2 R^{\frac{2}{m}} + \dots + \alpha \cdot p_{m-1} \cdot R^{\frac{m-1}{m}}$$

De ces équations on tirera sans peine:

$$p = \frac{1}{m} (y_1 + y_2 + \dots + y_m)$$

$$R^{\frac{1}{m}} = \frac{1}{m} (y_1 + \alpha^{m-1} y_2 + \dots + \alpha y_m)$$

$$p_2 R^{\frac{2}{m}} = \frac{1}{m} (y_1 + \alpha^{m-2} y_2 + \dots + \alpha^2 y_m)$$

⋮

⋮

$$p_{m-1} R^{\frac{m-1}{m}} = \frac{1}{m} (y_1 + \alpha y_2 + \dots + \alpha^{m-1} y_m)$$

On voit par là que p, p_1 etc. p_{m-1}, R et $R^{\frac{1}{m}}$ sont des fonctions rationnelles des racines de l'équation proposée.

Considerons maintenant une quelconque de ces quantités, par exemple R . Soit

$$R = S + v^{\frac{1}{n}} + S_2 v^{\frac{2}{n}} + \dots + S_{n-1} v^{\frac{n-1}{n}}$$

En traitant cette quantité de la même manière que y on obtiendra un pareil résultat savoir que les quantités $v^{\frac{1}{n}}, v, S_2$ etc. sont des fonctions rationnelles des différentes valeurs de la fonction R ; et comme celles-ci sont des fonctions rationnelles de y_1, y_2 etc. les fonctions $v^{\frac{1}{n}}, v, S, S_2$ etc. le sont de même. En poursuivant ce raisonnement on conclura que toutes les fonctions irrationnelles contenues dans l'expression de y sont des fonctions rationnelles des racines de l'équation proposée. Cela posé, il n'est pas difficile d'achever la démonstration. Considerons d'abord les fonctions irrationnelles de la forme

$$R^{\frac{1}{m}}$$

R étant une fonction rationnelle de a, b, c, d et e Soit $R^{\frac{1}{m}} = r$, r est une fonction rationnelle de y_1, y_2, y_3, y_4 et y_5 et R une fonction symétrique de ces quantités. Maintenant comme il s'agit de la résolution de l'équation générale du cinquième degré il est clair qu'on peut considérer y_1, y_2, y_3, y_4 et y_5 comme des variables indépendantes; l'équation $R^{\frac{1}{m}} = r$ doit donc avoir lieu dans cette supposition; On peut donc aussi changer les quantités y_1, y_2, y_3, y_4 et y_5 entre elles dans l'équation $R^{\frac{1}{m}} = r$; or par ce changement $R^{\frac{1}{m}}$ obtient nécessairement m valeurs différentes en remarquant que R est une fonction symétrique; La fonction r doit donc avoir la propriété qu'elle obtient m valeurs différentes en changeant entre elles de toutes les manières possibles les cinq variables qu'elle contient. Or pour cela il faut que $m=5$ ou $m=2$ en remarquant que m est un nombre premier. (Voyez un mémoire de M. Cauchy inséré dans le Journal de l'école polytechnique XVII^e Cahier) Soit d'abord $m=5$; La fonction r a donc cinq valeurs différentes, et peut par conséquent être mise sous cette forme:

$$R^{\frac{1}{5}} = r = p + p_1 y_1 + p_2 y_1^2 + p_3 y_1^3 + p_4 y_1^4$$

p, p_1, p_2, \dots étant des fonctions symétriques de y_1, y_2 , etc.

Cette équation donne en changeant y_1 en y_2

$$\begin{aligned} p + p_1 y_1 + p_2 y_2 + p_3 y_3 + p_4 y^4 = \\ \alpha p + \alpha p_1 y_2 + \alpha p_2 y_2 + \alpha p_3 y_3 + \alpha p_4 y^4 \\ \text{où } \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 = 0 \end{aligned}$$

mais cette équation ne peut pas avoir lieu; le nombre m doit par conséquent être égal à deux. Soit donc

$$R^{\frac{1}{2}} = r$$

r doit avoir deux valeurs différentes et de signe contraire; on aura donc (Voyez le mémoire de M. Cauchy)

$$R^{\frac{1}{2}} = r = v \cdot (y_1 - y_2) (y_1 - y_3) \dots (y_2 - y_3) \dots (y_4 - y_5) = v \cdot S^{\frac{1}{2}}$$

v étant une fonction symétrique.

Considérons maintenant les fonctions irrationnelles de la forme

$$\left(p + p_1 R^{\frac{1}{\nu}} + p_2 R_1^{\frac{1}{\mu}} + \dots \right)^{\frac{1}{m}}$$

p, p_1, p_2 , etc. R, R_1 , etc. étant des fonctions rationnelles de a, b, c, d et e et par conséquent des fonctions symétriques de y_1, y_2, y_3, y_4 et y_5 . Comme on a vu on doit avoir $\nu = \mu = \text{etc.} = 2$ $R = v^2, S, R_1 = v_1^2 S$, etc.

La fonction précédente peut donc être mise sous la forme

$$(p + p_1 S^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{m}}$$

Soit

$$r = (p + p_1 S^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{m}}$$

$$r_1 = (p - p_1 S^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{m}}$$

on aura en multipliant

$$r r_1 = (p^2 - p_1^2 S)^{\frac{1}{m}}$$

Si maintenant $r r_1$ n'est pas une fonction symétrique le nombre m doit être égal à deux; mais dans ce cas r aura quatre valeurs différentes ce qui est impossible; il faut donc que $r r_1$ soit une fonction symétrique. Soit cette fonction $= v$ on aura

$$r+r_1=(p+p_1S^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{m}}+v(p+p_1S^{\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{m}}=z$$

Cette fonction a m valeurs différentes, il faut donc que $m=5$ en remarquant que m est un nombre premier. On aura par conséquent

$$z=q+q_1y+q_2y^2+q_3y^3+q_4y^4=(p+p_1S^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{5}}+v(p+p_1S^{\frac{1}{2}})^{-\frac{1}{5}}$$

q, q_1, q_2 etc. étant des fonctions symétriques de y_1, y_2, y_3 etc. et par conséquent des fonctions rationnelles de a, b, c, d et e . En combinant cette équation avec l'équation proposée, on en tirera la valeur de y exprimée par une fonction rationnelle de z, a, b, c, d et e ; Or une telle fonction est toujours réductible à la forme

$$y=P+R^{\frac{1}{2}}+P_2R^{\frac{2}{5}}+P_3R^{\frac{3}{5}}+P_4R^{\frac{4}{5}}$$

on P, R, P_2, P_3 et P_4 sont des fonctions de la forme $p+p_1S^{\frac{1}{2}}, p, p_1$ et S étant des fonctions rationnelles de a, b, c, d et e . De cette valeur de y on tire

$$R^{\frac{1}{5}}=\frac{1}{5}(y_1+\alpha^4y_2+\alpha^3y_3+\alpha^2y_4+\alpha y_5)=(p+p_1S^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{5}}$$

où

$$\alpha^4+\alpha^3+\alpha^2+\alpha+1=0$$

Or le premier membre a 120 valeurs différentes et le second membre seulement 10; par conséquent y ne peut avoir la forme que nous venons de trouver; mais nous avons démontré que y doit nécessairement avoir cette forme si l'équation proposée est résoluble, nous concluons donc:

"Il est impossible de résoudre par des radicaux l'équation générale du cinquième degré."

Il suit immédiatement de ce théorème qu'il est de même impossible de résoudre par des radicaux les équations générales des degrés supérieurs au cinquième.

Fin.